




Zanthoxylum schinifolium



Hoogte	3 - 4 m
Breedte	3-4m
Kroon	rond, halfopen kroon, grillig groeiend
Schors en takken	twijgen bruin, steeds met één platte doorn onder iedere knop, bast grijs
Blad	oneven geveerd met 11 - 21 deelblaadjes, langwerpig-ovaal, donkergroen, 2 - 3 cm, geveerd blad
Herfstkleur	geel
Bloemen	in okselstandige bundels, groen tot bruingroen, juli/augustus
Vruchten	vlezige ronde doosvrucht, groen tot bruinrood, aromatisch
Stekels/doorns	Ja
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	weinig eisend
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	6 (-23,3 tot -17,8 °C)
Windbestendigheid	redelijk tot goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders
Toepassing	boombakken, daktuinen
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Oostelijk China, Korea, Japan

Vanuit een struikvorm tot kleine, soms meerstammige boom met een ronde kroon uitgroeiend. Op de twijgen is onder iedere knop is één platte doorn geplaatst. Bij de oude bast zijn deze doorns soms nog als kleine bulten zichtbaar. De sierlijke, oneven geveerde bladeren bestaan uit 11 tot 21 donkergroene langwerpig-ovale deelblaadjes. De bladranden hebben fijne afgeronde tanden en ingesneden toppen. De bladspil is onbehaard en aan de onderzijde bezet met fijne stekels. In de herfst kleurt het blad geel. De compacte bundels groene tot bruingroene bloemen openen in juli en augustus. Ze worden gevolgd door kleine groen tot bruinrode, bolronde, vlezige doosvruchten die zwarte zaden bevatten. Net als bij *Z. piperitum* worden de zaden in Japan gemalen en als peper in gerechten gebruikt. Een parkboom die weinig eisen aan de bodem stelt.